



CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ “ADOLF HAIMOVICI” 2020

Etapa locală, Iași - 17 ianuarie 2020

Clasa a X-a- Secțiunea H1

Problema 1.

a) Arătați că $\sqrt{2n + \sqrt{4n^2 - 1}} = \frac{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}{\sqrt{2}}$, pentru orice număr natural nenul n .

b) Fie $S_n = \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} + \frac{1}{\sqrt{4+\sqrt{15}}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n+\sqrt{4n^2-1}}}$. Determinați cel mai mare număr natural n pentru care $S_n < \sqrt{2}$.

Soluție:

1.a) - 4 p

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}{\sqrt{2}} &= \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{2n+1 + 2\sqrt{4n^2-1} + 2n+1}{2}} = \\ &= \sqrt{\frac{4n + 2\sqrt{4n^2-1}}{2}} = \sqrt{2n + \sqrt{4n^2-1}} \dots\dots\dots 4p \end{aligned}$$

1.b) - 3p, din care:

$$S_n = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}+1} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2n+1}-1}{2} \right) < \sqrt{2} \dots\dots\dots 1p$$

Deci, $\frac{\sqrt{2n+1}-1}{2} < 1$, de unde obținem că $\sqrt{2n+1} < 3, 2n+1 < 9, n < 4$. Deci, cel mai mare număr natural n pentru care $S_n < \sqrt{2}$ este $n = 3$ 2p

Problema 2.

Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z^2 - (m+3i)z + (m+5)i + m+5$, $m \in \mathbb{R}$.

a) Pentru $m = 0$, calculați $f(i) - f(-i)$.

b) Aflați numerele reale m pentru care ecuația $f(z) = 0$ are cel puțin o soluție reală.

c) Arătați că funcția $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $g(z) = f(z) + f(\varepsilon z) + g(\varepsilon^2 z)$ nu este injectivă, unde ε este un număr complex cu $\varepsilon^3 = 1$, $\varepsilon \neq 1$.

Soluție:

2.a) - 1p

$$f(i) = 7 + 5i, f(-i) = 1 + 5i, f(i) - f(-i) = 6 \dots\dots\dots 1p$$

2.b) - 3p, din care:

$$z^2 - mz + m + 5 + (-3z + m + 5) = 0, z \in \mathbb{R} \dots\dots\dots 1p$$

$$z = 0, m = -5 \text{ sau } z = 4, m = 7 \dots\dots\dots 2p$$

2.c) - 3p, din care:

$$\text{Considerăm } z \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\} \text{ } z \neq az \dots\dots\dots 1p$$



$$g(z) = f(z) + f(\varepsilon z) + g(\varepsilon^2 z), \quad g(\varepsilon z) = f(\varepsilon z) + f(\varepsilon^2 z) + g(\varepsilon^3 z) \dots\dots\dots 2p$$

Problema 3.

Se consideră funcția $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_2 x$

- a) Aflați $m, n \in \mathbb{R}$ știind că $f(x^2 \cdot \sqrt[3]{y}) = m \cdot f(x) + n \cdot f(y)$, pentru orice $x, y \in (0, \infty)$.
- b) Dacă $a, b \in (0, \infty)$ astfel încât $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{f(a) + f(b)}{2}$, determinați $\frac{a}{b}$.
- c) Demonstrați că, dacă $a, b \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, atunci $a \log_2 a + b \log_2 b \leq -(a+b) \log_2 (a+b)$.

Soluție:

3.a) - 1p

$$m = 2, \quad n = \frac{1}{3} \dots\dots\dots 1p$$

3.b) - 2p

$$\text{Relația este echivalentă cu } \frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}, \text{ deci } \frac{a}{b} = 1 \dots\dots\dots 2p$$

c) 4 p, din care:

$$a[\log_2 a(a+b)] + b[\log_2 b(a+b)] \leq 0 \dots\dots\dots 1p$$

$$\log_2 [a(a+b)]^a \cdot [b(a+b)]^b \leq 0 \dots\dots\dots 1p$$

$$a^a (a+b)^{a+b} b^b \leq 1 \Leftrightarrow a^a b^b \leq \frac{1}{(a+b)^{a+b}} \dots\dots\dots 1p$$

$$\text{De unde concluzia: } a \log_2 a + b \log_2 b \leq -(a+b) \log_2 (a+b) \dots\dots\dots 1p$$

Problema 4.

a) În sistemul xOy se consideră un triunghi echilateral astfel încât afixele a două dintre vârfuri sunt $z_1 = 0, z_2 = 2$. Determinați afixul celui de-al treilea vârf al acestui triunghi.

b) Demonstrați că, dacă z_1, z_2, z_3 sunt numere complexe astfel încât $z_1 + z_2 + z_3 = 0, |z_1| = |z_2| = |z_3|$, atunci $|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_3 - z_1|$.

Soluție:

4.a) - 4 p, din care:

$$|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_3 - z_1|. \text{ Notăm } z_3 = a + bi, a, b \in \mathbb{R} \dots\dots\dots 1p$$

$$\text{Obținem } |-2| = |2 - a - bi| = |a + 9bi| \dots\dots\dots 1p$$

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 4 \\ a^2 + b^2 = a^2 - 4a + 4 + b^2 \end{cases}, \text{ cu soluțiile } (1, -\sqrt{3}), (1, \sqrt{3}). \dots\dots\dots 1p$$

$$\text{Al treilea vârf al triunghiului are afixul } z_3 = 1 + \sqrt{3}i \text{ sau } z_3 = 1 - \sqrt{3}i. \dots\dots\dots 1p$$

4.b) - 3 p, din care:

Fie $M_i(z_i), i = \overline{1,3}$. Centrul de greutate G al triunghiului $M_1 M_2 M_3$ are afixul

$$z_G = \frac{1}{3}(z_1 + z_2 + z_3) = 0 \dots\dots\dots 1p$$



Dar $|z_1| = |z_2| = |z_3|$, deci $OM_1 = OM_2 = OM_3$, de unde rezultă că triunghiul $M_1M_2M_3$ este
echilateral, deci $|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_3 - z_1|$ 2p