

Olimpiada Națională de Matematică 2020 Etapa locală – Iași

CLASA a VIII-a

Barem de corectare

Problema 1.

- a) Dacă $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ astfel încât $a^2 + b^2 = 13, c^2 + d^2 = 7$ și $ab = cd = 2\sqrt{3}$, să se demonstreze că $\frac{11}{|a - b|} + \frac{2}{|c + d|} \in \mathbb{Q}$.

(Dorel Luchian)

- b) Se consideră fracția $F(x) = \frac{2x^3 - x^2 + x + 1}{2x^3 - 3x^2 + 3x - 1}$, unde $x \in \mathbb{Z}$.

- i) Arătati că $F(x)$ se poate simplifica prin numărul $x^2 - x + 1$.

- ii) Determinati valorile lui $x \in \mathbb{Z}$ pentru care $F(x) \in \mathbb{Z}$.

(Remus Nechita)

Solutie si barem:

a) $(a-b)^2 = 13 - 4\sqrt{3} = (2\sqrt{3} - 1)^2$, $(c+d)^2 = (2 + \sqrt{3})^2$ 2p

$$\frac{11}{|a-b|} + \frac{2}{|c+d|} = \frac{11}{2\sqrt{3}-1} + \frac{2}{2+\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} + 1 + 4 - 2\sqrt{3} = 5 \in \mathbb{Q} \dots \quad 2p$$

b) i) $F(x) = \frac{2x^3 - x^2 + x + 1}{2x^3 - 3x^2 + 3x - 1} = \frac{(x^2 - x + 1)(2x + 1)}{(x^2 - x + 1)(2x - 1)} = \frac{2x + 1}{2x - 1}$ 2p




Problema 2.

Se consideră piramida patrulateră regulată $VABCD$ a cărei înălțime VO este cât jumătate din muchia bazei. Știind că punctul S este simetricul punctului A față de V , demonstrați că:

- a) dreapta SC este paralelă cu planul (VBD) ;
- b) dreapta CV este perpendiculară pe planul (SBD) .

(Claudiu-Ştefan Popa și Gabriela Popa)

Soluție și barem:



- a) $VABCD$ este piramidă regulată și $AC \cap BD = \{O\}$, rezultă că O este mijlocul lui $[AC]$.

Din ipoteză, V este mijlocul lui $[AS]$, deci (VO) este linie mijlocie în ΔSAC și astfel $VO \parallel SC$.

Deoarece $VO \parallel SC$ și $VO \subset (VBD)$, rezultă că $SC \parallel (VBD)$ 3p

- b) Deoarece (VO) este linie mijlocie în ΔSAC , rezultă că $VO = \frac{SC}{2} = \frac{AB}{2}$, deci $SC = AB = BC = CD$.

Cum $SC \parallel VO$ și $VO \perp (ABC) \Rightarrow SC \perp (ABC) \Rightarrow SC \perp BC, SC \perp CD$.

Deoarece $\Delta CBS \equiv \Delta CDS \equiv \Delta CBD$ (C.C.), rezultă că $(BS) \equiv (DS) \equiv (BD)$.

Din ipoteză $(VA) \equiv (VS) \equiv (VD) \equiv (VB)$, prin urmare piramidele $VBDS$ și $CBDS$, cu vârfurile în V , respectiv C sunt piramide regulate..... 2p

Fie Q centrul triunghiului echilateral SBD . Deoarece $VBDS$ este piramidă regulată, rezultă că $VQ \perp (BDS)$.

Deoarece $CBDS$ este piramidă regulată, rezultă că $CQ \perp (BDS)$.



Ținând cont de unicitatea perpendicularei dusă printr-un punct pe un plan, rezultă că V, Q, C sunt puncte coliniare, deci $CV \perp (SBD)$ 2p


Problema 3.

Se consideră piramida hexagonală regulată $VABCDEF$ de vârf V , în care A_1 este mijlocul lui $[CD]$, O este centrul bazei, $AA_1 \cap CF = \{M\}$ și $R \in [VF]$ astfel încât $2VF = 3FR$. Demonstrați că:

- dreptele AC și VE sunt perpendiculare;
- dreapta RM este paralelă cu planul (VBC) ;
- RM, AT și VO sunt drepte concurente, T fiind mijlocul lui $[VD]$.

(Dorel Luchian)

Soluție și barem:



- Deoarece $ABCDEF$ este hexagon regulat de centru O , rezultă că $ABCO$ este romb, deci $AC \perp OB = OE$. Piramida $VABCDEF$ fiind regulată, rezultă că $VO \perp AC$.
Așadar $AC \perp (VOE)$, iar $VE \subset (VOE)$, deci $AC \perp VE$ 2p

b) În $\triangle ADC$ punctul M este centrul de greutate, deci $\frac{CM}{MO} = 2 \Rightarrow \frac{FM}{CM} = 2$.

Din ipoteză, deducem că $\frac{FR}{RV} = 2$, astfel că, pe baza reciprocei teoremei lui Thales în $\triangle CDF$, se obține

$RM \parallel CV$. Deoarece $CV \subset (VBC)$, rezultă că $RM \parallel (VBC)$ 3p



- c) În $\Delta C F V$, fie $\{S\} = VO \cap MR$. Cum $SM \parallel CV$, folosind teorema lui Thales, se obține că $VS = 2SO$.
În $\Delta V A D$, S este centrul de greutate și AT este mediană, deci dreptele RM, AT și VO sunt concurente în S2p

Problema 4.

Se consideră numerele reale x și y . Demonstrați că:

- a) $x + y = xy$ dacă și numai dacă există un număr real nenul a astfel încât $x = 1 + a$ și $y = 1 + \frac{1}{a}$;
b) dacă $x + y = xy$, atunci $x + y \leq 0$ sau $x + y \geq 4$.

(Claudiu-Ştefan Popa)

Soluție și barem:

a) \Rightarrow :

Cum $x + y = xy \Rightarrow xy - x = y \Rightarrow x(y - 1) = y$; observăm că $y \neq 1$, căci, dacă

$$y = 1 \Rightarrow x + 1 = x \cdot 1 \Rightarrow 1 = 0 \text{ (F). Prin urmare } x(y - 1) = y \Rightarrow x = \frac{y}{y - 1} \Rightarrow x = 1 + \frac{1}{y - 1}.$$

Cum $y = 1 + (y - 1)$, alegem $a = \frac{1}{y - 1}$2p

\Leftarrow

$$\left. \begin{array}{l} x + y = (1 + a) + \left(1 + \frac{1}{a}\right) = 2 + a + \frac{1}{a}, a \neq 0 \\ xy = (1 + a) \left(1 + \frac{1}{a}\right) = 1 + \frac{1}{a} + a + 1 = 2 + a + \frac{1}{a} \end{array} \right\} \Rightarrow x + y = xy2p$$

- b) Dacă $x + y = xy$, conform a), există $a \in \mathbb{R}^*$ astfel încât $x = 1 + a$ și $y = 1 + \frac{1}{a}$.

- dacă $a > 0$, avem $a + \frac{1}{a} \geq 2$, căci $\frac{a + \frac{1}{a}}{2} \geq \sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} \Leftrightarrow \frac{a + \frac{1}{a}}{2} \geq 1$, cu „= $\Leftrightarrow a = \frac{1}{a} \Leftrightarrow a = 1$, deci

$$x + y = 2 + a + \frac{1}{a} \geq 2 + 2 \Rightarrow x + y \geq 4, \text{ cu } „=&mathcal{L} \Leftrightarrow x = y = 22p$$

- dacă $a < 0$, avem $(-a) + \frac{1}{(-a)} \geq 2 \Leftrightarrow -\left(a + \frac{1}{a}\right) \geq 2 \Leftrightarrow a + \frac{1}{a} \leq -2$, cu „= $\Leftrightarrow a = \frac{1}{a} \Leftrightarrow a = -1$,

$$\text{deci } x + y = 2 + a + \frac{1}{a} \leq 2 - 2 \Rightarrow x + y \leq 0, \text{ cu } „=&mathcal{L} \Leftrightarrow x = y = 01p$$