



CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ
“ADOLF HAIMOVICI”
Etapa locală, 17 ianuarie 2020
Barem de corectare și notare
CLASA a XI-a H 2

Nr.subiect	Soluție	Punctaj
1.a	$I_2 + A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$ $(I_2 + A)^2 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} = I_2 + A$	2p
1.b	$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} = -A.$ $\text{Deci } A^2 = -A.$ $A^3 = A^2 \cdot A = -A \cdot A = -A^2 = A$ $A^4 = A^2 \cdot A^2 = (-A) \cdot (-A) = A^2 = -A$ <p>Deci, dacă $n = 2k$, atunci $A^n = -A$, iar dacă $n = 2k + 1$, atunci $A^n = A$. Prin urmare $\{A^n \mid n \in \mathbb{N}^*\} = \{-A, A\}$ și deci este o mulțime finită.</p>	2p
1.c	$X^3 = A \Rightarrow \det(X^3) = \det(A).$ <p>Cum $\det(A) = 0$, obținem $\det(X^3) = 0$ și deci $\det(X) = 0$.</p> <p>Dacă $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, atunci $\det(X) = ad - bc = 0$ și deci $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \stackrel{\text{not}}{\cong} k$.</p> <p>Rezultă $X = \begin{pmatrix} kb & b \\ kd & d \end{pmatrix}$.</p> <p>Atunci $X^2 = \begin{pmatrix} kb & b \\ kd & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} kb & b \\ kd & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kb(kb+d) & b(kb+d) \\ kd(kb+d) & d(kb+d) \end{pmatrix} =$</p> $(kb+d) \begin{pmatrix} kb & b \\ kd & d \end{pmatrix} = (kb+d)X.$ <p>În continuare $X^3 = X^2 \cdot X = (kb+d)X^2 = (kb+d)^2X$.</p> <p>Atunci ecuația $X^3 = A$ devine $(kb+d)^2X = A$, de unde $X = \frac{1}{(kb+d)^2}A$ și $X^3 = \frac{1}{(kb+d)^6}A^3$.</p> <p>Cum $A^3 = A$ și $X^3 = A$, obținem $A = \frac{1}{(kb+d)^6}A$, adică $\frac{1}{(kb+d)^6} = 1$.</p> <p>Prin urmare $\frac{1}{(kb+d)^2} = 1$ și deci $X = A$.</p>	3p

Nr.subiect	Soluție	Punctaj
2.a	$\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \Leftrightarrow l_s(1) = l_d(1)$ $l_s(1) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+3}} = \frac{3 \cdot 1 + 1}{\sqrt{1+3}} = 2$ $l_d(1) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{a \cdot \operatorname{tg}(x-1)}{x^2+3x-4} = a \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{\operatorname{tg}(x-1)}{(x-1)(x+4)}$ $= a \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{\operatorname{tg}(x-1)}{x-1} = \frac{a}{5}$ <p>Atunci $2 = \frac{a}{5}$ și deci $a = 10$.</p>	1p
		2p
		1p



2.b	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + 1}{\sqrt{x^2 + 3}} = -3$ <p>Deci $y = -3$ este asymptota spre $-\infty$ a graficului funcției f.</p>	2p 1p
-----	--	----------

Nr.subiect	Soluție	Punctaj
3.a	$\lim_{x \rightarrow -3} \left(\frac{1}{x+3} - \frac{27}{x^3+27} \right) = \lim_{x \rightarrow -3} \left(\frac{x^2-3x+9-27}{(x+3)(x^2-3x+9)} \right)$ $= \lim_{x \rightarrow -3} \left(\frac{(x+3)(x-6)}{(x+3)(x^2-3x+9)} \right)$ $= \lim_{x \rightarrow -3} \left(\frac{(x-6)}{(x^2-3x+9)} \right)$ $= \frac{\frac{(x-6)}{(x^2-3x+9)}}{\frac{9}{27}} = \frac{-1}{3}$	1p
3.b	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(5^x - 1) \ln(1 + 5 \sin x)}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x - 1} \cdot \frac{tg(5x)}{tg(5x)}$ $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 1}{x} \cdot \frac{5x}{1} \cdot \frac{\ln(1 + 5 \sin x)}{5 \sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x}{1}$ $\cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x - 1}$ $ln5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x^2+x+1}-x-1} = \frac{ln5}{1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2+x+1}+x+1)x}{(x^2+x+1)-(x+1)^2} =$ $= \frac{ln5}{1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2+x+1}+x+1)x}{-x} = -2 \ln 5$	2p 1p 1p

Nr.subiect	Soluție	Punctaj
4.	<p>Fie $C(a, b)$ vârful comun. Deoarece $C(a, b) \in d$: $2y - x + 3 = 0$, vom avea $2b - a + 3 = 0$. Astfel $b = \frac{a-3}{2}$ și $C(a, \frac{a-3}{2})$.</p> <p>$b \geq 0 \Rightarrow a \geq 3$</p> <p>Cum parcelele au aceeași arie, avem $A_{\Delta ABC} = A_{\Delta OCD}$ și deci $\Delta_1 = \Delta_2$, unde</p> $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ a & \frac{a-3}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{3a+9}{2} \text{ și } \Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \\ a & \frac{a-3}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{5(a-3)}{2}.$ <p>Din condiția $\Delta_1 = \Delta_2$ rezultă $3a + 9 = 5a - 15$, având soluțiile $a = 12$ și $a = \frac{3}{4}$.</p> <p>Cum $a \geq 3$, soluția problemei va fi $C(12, \frac{9}{2})$.</p>	1p 1p 2p 2p 1p